

Artritis por Leishmaniosis


Una de las causas de cojera son las artritis. La artritis es la inflamación de las articulaciones. La articulación sinovial está conformada por el hueso subcondral, el cartílago articular, la cápsula articular y el líquido sinovial y todos estos componentes juegan un papel crucial en el estado de salud y en la función de la articulación. La artritis conduce a un daño e inflamación de estas estructuras causando dolor y cojera.

Los tipos de artritis son osteoartritis degenerativa (artrosis), infecciosa e inmunomediada. Una de las causas de artritis infecciosa es la Leishmaniosis

Los mecanismos principales por los que se presentan artritis en la leishmaniosis son la acción directa del parásito a nivel articular o a través del depósito de inmunocomplejos circulantes en la articulación desencadenando una reacción de hipersensibilidad de tipo III. La presentación clínica típica es la cojera, algunas veces intermitente. Puede afectar a una articulación o a varias.

El diagnóstico consiste en el análisis del líquido sinovial para observar macrófagos con amastigotes de Leishmania.

El tratamiento consiste en combatir la causa, la Leishmaniosis con antimoniales y allopurinol y antiinflamatorios para tratar la propia artritis.



Artritis por Leishmaniosis

Jose Rial Cels

Veterinario acreditado AVEPA en traumatología y ortopedia

www.veterinariamarinabaixa.com

